

توصیه های بعد از بیوپسی

- از انجام فعالیتهای جسمی یا ورزش های سنگین که باعث فشار یا ضربه به محل زخم می شود خودداری کنید.
- خارش خفیف در روزهای ابتدائی طبیعی است، از خاراندن زخم خودداری کنید و فقط پوست را ماساژ دهید.
- تا زمان ترمیم کامل پوست باید آن را از نور خورشید محافظت کنید.
- در صورت مصرف داروهای رقیق کننده خون مثل آسپرین، وارفارین، پلاویکس قبل از بیوپسی حتما پزشک خود را در جریان قرار دهید.
- در صورت داشتن سابقه حساسیت به داروهای بیحسی قبل از نمونه برداری، پزشک خود را در جریان قرار دهید.

- تا ۲۴ ساعت از باز کردن پانسمان خودداری کنید و از تماس آب با ناحیه پرهیز کنید.
- بعد از ۲۴ ساعت محل زخم را به آرامی با آب و صابون بشوئید، اما به هیچ وجه به مدت طولانی در آب غوطه ور نکنید، چون تماس زیاد با آب باعث کاهش سرعت بهبود زخم و افزایش احتمال عفونت می شود.
- پس از شست و شو می توانید زخم را با لایه های نازک آنتی بیوتیک بپوشانید.
- در صورت خونریزی از محل بخیه و یا خروج ترشحات چرکی زرد رنگ یا سبز رنگ، به پزشک خود مراجعه نمائید.
- به محل بخیه الکل، آب اکسیژنه، کرم های آرایشی، نرم کننده و بتادین نزدیک نباشد زیرا باعث آسیب بافت و تاخیر در بهبودی زخم می شود.
- زخم های پوستی با بخیه های غیر قابل جذب بخیه می شوند، زمان دقیق کشیدن بخیه ها را پزشک هنگام ترخیص به شما خواهد گفت.

مراقبت های بعد از بیوپسی



بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سرطان کرکات

کد سند: ۳۹-۲۰-۶-BCC

تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۷

☎ ۰۲۱-۹۲۰۰۱۳۶۰

📱 barkat.ccenter

🌐 bcc.barkatshd.com

