

امروزه بعد از تحقیقات انجام شده ، مورفین در لیست داروهای قابل دسترس برای کنترل موثر درد قرار گرفته است.

آیا مورفین تنها در مرحله آخر بیماری سرطان تجویز می شود؟

یقیناً خیر! در حقیقت مورفین توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان داروی انتخابی جهت کمک به کاهش انواع مشخصی از دردهای ناشی از سرطان توصیه شده است. مورفین به تنهایی یا همراه با سایر داروها به عنوان جزئی از رژیم درمانی درد ناشی از سرطان به کار می رود.

کنترل درد به شما این اجازه را خواهد داد که راحت تر بخوابید ، فعالیت بیشتری داشته باشید و از معاشرت با بستگان و دوستان خود بیشتر لذت ببرید.

هدف از ارائه این بروشور، پاسخگویی به شایع ترین سوالاتی است که توسط بیماران و بستگان آن ها در ارتباط با مصرف داروهای مخدر پرسیده می شود. گاهی اوقات افراد به علل مختلفی در خصوص طرح سوالات خود در زمینه درد یا درمان آن تردید دارند. احتمالاً پاسخ برخی از سوالات خود را در این کتابچه خواهید یافت. اما اگر باز هم سوالی به ذهنتان می رسد ، پاسخ آن ها را از پزشک خود بخواهید.

درک این موضوع اهمیت دارد که ابتلا به بیماری سرطان به معنای تحمل درد نیست. امروزه با داروهای در دسترس ، اغلب دردهای ناشی از سرطان قابل کنترل خواهند بود.

داروهای مخدر در تمام دنیا به عنوان یکی از موثرترین درمانهای کنترل درد ناشی از سرطان شناخته شده است.

هدف پزشک شما از تجویز این داروها ، کنترل درد شماست.

داروهای مخدر به چه داروهایی گفته می شود؟

به هر دارویی که اثراتی مشابه داروی مورفین داشته باشد شامل اکسی کدون ، کدئین ، ترامادول ، متادون ، بوپره نورفین و فنتانیل.

مورفین از کجا می آید؟

مورفین یک مشتق طبیعی گیاه اپیوم می باشد. اپیوم از گیاه خشخاش تهیه می شود . قرن هاست که استفاده از مورفین برای کنترل درد شناخته شده است.

حقایق ساده در مورد درمان درد با داروهای مخدر در بیماران مبتلا به سرطان



پارستان تخصصی و فوق تخصصی سرطان برکت

کد سند: ۴۱-۲۰-۶-BCC

تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۷

تهیه و تنظیم: دکتر سیده گلناز ضیائی

☎ ۰۲۱-۹۲۰۰۱۳۶۰

📱 barkat.ccenter

🌐 bcc.barkatshd.com





آیا من به مورفین معتاد خواهم شد؟

مطالعات انجام شده توسط سازمان بهداشت جهانی نشان داده است که اعتیاد در بیمارانی که سابقه سوء استفاده دارویی نداشته اند، به ندرت ایجاد می شود. اعتیاد به دارو زمانی ایجاد می شود که دارو با هدف "ایجاد سرخوشی" مصرف شود و این مورد با زمانی که پزشک به منظور کنترل درد، دارو را تجویز نموده است بسیار متفاوت خواهد بود.

شما مورفین را برای کنترل درد ناشی از سرطان دریافت می کنید و احتمال بروز اعتیاد چنانچه دقیقاً طبق دستور پزشک خود، آن را مصرف کنید، بسیار پایین خواهد بود.

آیا هنگام مصرف مورفین خواب آلوده خواهم شد؟

ممکن است برخی افراد هنگامی که برای اولین بار مورفین استفاده می کنند، کمی احساس خواب آلودگی کنند. این حالت اغلب بعد از گذشت چند روز برطرف خواهد شد. زمانی که درد دارید، خوابیدن برایتان مشکل خواهد بود، بنابراین بعد از آنکه درد شما کنترل می شود احساس راحتی بیشتری خواهید کرد و ممکن است برای چند روزی بیش از گذشته نیاز به خوابیدن پیدا کنید که در حقیقت جبران بی خوابی های گذشته شما خواهد بود.

اگر بیش از چند روز احساس خواب آلودگی کردید، پزشک خود را در جریان بگذارید. مقدار صحیح مورفین نبایستی موجب خواب آلودگی بیش از حد شود.

آیا حین مصرف مورفین مجاز به رانندگی هستم؟

مانند بسیاری از داروهای دیگر، هنگام مصرف مورفین شما مجاز به رانندگی و کار با ماشین های سنگین و دستگاه های حساس نیستید. مصرف مورفین ممکن است موجب کند شدن عکس العمل سریع شما در مواقع لزوم شود.

آیا حین مصرف مورفین مجاز به استفاده از داروهای دیگر هستم؟

شما باید پزشک خود را نسبت به کلیه داروهای مصرفی آگاه کنید. پزشک شما ممکن است توصیه کند که حین مصرف مورفین از دریافت سایر آرام بخش ها اجتناب کنید. این قبیل داروها اثرات آرام بخشی مورفین را می توانند افزایش دهند.

آیا مصرف مورفین وضعیت اجابت مزاجم را تغییر می دهد؟

مورفین حرکات روده را کاهش می دهد. به همین دلیل پزشک شما به منظور پیشگیری از یبوست، برای شما ملین (مسهل) تجویز خواهد کرد. هنگام مصرف مورفین باید به طور منظم ملین مصرف کنید، مگر آنکه پزشک به هر دلیلی مصرف آن را توصیه نکند. در صورتی که با اجابت مزاج خود حین مصرف مورفین مشکل دارید، با پزشک خود در ارتباط با تنظیم مقدار مناسب ملین صحبت کنید.

آیا مصرف مورفین موجب حالت تهوع می شود؟

برخی افراد هنگام شروع مصرف مورفین دچار حالت تهوع می شوند. اگر بعد از گذشت چند روز همچنان حالت تهوع داشتید، پزشک خود را در جریان بگذارید. او می تواند با تجویز داروهای ضدتهوع در رفع این حالت، به شما کمک کند.

آیا مصرف مورفین موجب احساس گیجی می شود؟

اگر حین مصرف مورفین احساس گیجی می کنید، احتمالاً لازم است مقدار دارو توسط پزشک مجدداً تنظیم شود. شما باید در رابطه با این موضوع با پزشک خود مشورت کنید.

چه مقدار مورفین برای من کافی خواهد بود؟

مقدار مورد نیاز برای هر بیمار با بیمار دیگر متفاوت است. این پزشک شماست که مقدار مناسب مورفین را جهت کنترل درد با حداقل عوارض جانبی می تواند تنظیم کند.

در صورت وقوع مجدد درد حین مصرف مورفین چه باید کرد؟

پزشک به شما توضیح خواهد داد که در صورت وقوع مجدد درد حین مصرف مورفین چه باید بکنید. بدون مشاوره با پزشک، مقدار مورفین مصرفی خود را تغییر ندهید.

در پایان اینکه :

با صحبت کردن در مورد درد خود با پزشک و پرستار خود، به آن ها در جهت کنترل بهتر آن کمک خواهید کرد. شما تنها کسی هستید که می توانید بگویید که چه زمانی درد دارید، دردتان کجاست و چقدر درد دارید. بدون انتقال این اطلاعات، یقیناً پزشک شما قادر به کنترل مناسب درد شما نخواهد بود و مطمئن باشید که کنترل درد شما اهمیت بسیار زیادی در روند درمان شما و بهبود کیفیت زندگی شما خواهد داشت. با پزشکتان صحبت کنید...